



## Tarminvagination hos barn

Tarmarna i kroppen rör sig med kramande rörelser för att föra maten framåt. Invagination innebär att en del av tarmen har krupit in i den efterföljande delen. Då blir det stopp i tarmen och barnet får ofta mycket ont. Invagination är vanligast hos barn som är mellan sex månader och tre år och är lite vanligare hos pojkar än hos flickor. Det går inte att förebygga invagination.

Symtomen kan komma plötsligt, ibland efter en magsjuka eller i samband med en luftvägsinfektion. Det börjar med att barnet har rejält ont i magen.

- Intensivt skrik som kommer och går i intervall
- Intervallet mellan skriken blir kortare
- Barnet har ont och kan vara spänd i magen
- Barnet kan må illa och kräkas
- Det kan komma blod i avföringen
- Barnet blir trött, blekt och medtaget och verkar frånvarande

Man ska söka vård direkt på en akutmottagning om man misstänker att barnet har invagination.

Man kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Sök också vård direkt om barnet nyligen har fått vaccin mot rotavirus och får symptom på invagination. Det är mycket sällsynt, men risken att få invagination kan öka något den närmaste veckan efter vaccinationen.

Tarminvagination går bra att behandla om barnet får vård i tid.

Läs gärna mer om invagination, undersökning och behandling på 1177 Vårdguiden – Invagination hos barn.