

SKYDDSUTRUSTNING VID INITIALT OMHÄNDERTAGANDE AV PATIENT MED MISSTÄNKT ELLER BEKRÄFTAD COVID-19 ELLER MERS


SKYDDSUTRUSTNING

- Vätskeavvisande engångsskyddsrock eller långärmat plastförkläde
- Andningsskydd FFP3/FFP2 (om det inte finns tillgängligt använd kirurgiskt munskydd IIR)
- Visir (om FFP3 med täckt ventil används kan visir ersättas med skyddsglasögon)
- Handskar



INNAN DU BÖRJAR PÅKLÄDNINGEN

- Besök toalett vid behov
- Töm fickor på pennor, nycklar, telefoner etc.
- Lägg ifrån dig pennficka



PÅKLÄDNING

1 TVÄTTA OCH SPRITA HÄNDERNA

2 TAG PÅ ANDNINGSSKYDD

Tag på andningsskydd FFP3, framför spegel. Se till att det sluter tätt. Observera att skäggväxt kan ge sämre skyddseffekt. Använd FFP3 med täckt ventil om du avser vara en längre tid inne hos patient (hindrar kondensdroppar). Annars FFP3 utan täckt ventil.


3 TAG PÅ OPERATIONSBUVA

4 TAG PÅ LÅNGÄRMAT PLASTFÖRKLÄDE

5 TAG PÅ VISIR

6 SPRITA HÄNDERNA

7 TAG PÅ BLÅ NITRILHANDSKAR



NU ÄR DU REDO ATT GÅ IN TILL PATIENTEN!