

Antidoter Östersunds sjukhus

Antidoter ska användas vid behandling av akuta förgiftningar och är tillgängliga för hela regionen. De flesta antidoterna förvaras på akutmottagningen, se lagerkolumnen i Antidotlistan. Antidotregistret, <https://giftinformation.se/lakare/> (gul ruta längre ner på sidan) ger information om gällande lager av antidoter på sjukhus i Sverige.

Giftinformationscentralen

Tel 010-456 67 19, ring Giftinformationscentralen vid osäkerhet om hur läkemedel ska ges.

[Akuta förgiftningar - initial bedömning och behandling](#)
[Lista över rekommenderade antidoter](#)

Ansvariga

Bo Friberg, läkare, Medicinkliniken
Birgitta Olander, farmaceut, Läkemedelsenheten
Lina Dahlin, apotekare, Läkemedelsenheten
Moa Holmgren, sjuksköterska, Akutmottagningen
Peter Samuelsson, sjuksköterska, Akutmottagningen

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Acetylcystein	Acetylcystein	Lösning för nebulisator 200 mg/ml	4x10x10 ml	Vid överdosering med paracetamol, vit flugsvamp, lömsk flugsvamp och gifthätting. Se www.giftinfo.se : <u>Paracetamol, Amatoxinhaltiga svampar.</u>
	K	Antidigoxin Fab (fårserum) (Digitalisantidot)	DigiFab TM (licens)	Inf subst 40 mg Varje ampull löses i 4 ml sterilt vatten. Kan spädas ytterligare vid behov med NaCl 9 mg/ml.	4x1x40 mg Kontakta Gift-info angående indikation och dosering.	Vid digitalisförgiftning. Se www.giftinfo.se : <u>Digitalis.</u>
		Atropin	Atropin	Inj 0,5 mg/ml	20x1x20 ml	Vid kolinerg förgiftning. Se www.giftinfo.se : <u>Muskarinhaltiga svampar, Nervgaser, Organiska fosforföreningar.</u>

GODKÄNT AV
Anna Graneväm

GRANSKAD AV
Birgitta Olander

GILTIGT FR O M
2024-10-10

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Atropin	Atropinsulfat (licens)	Inj 100 mg (OBS!10 mg/ml) 1 ampull (10 ml) tillsätts till inf 100 ml NaCl. Ny konc 0,93 mg/ml (ca 1 mg/ml) Kontakta Gift- informationscentralen innan användning.	2x5x10 ml	Vid kolinerg förgiftning. Se www.giftinfo.se : <u>Muskarinhaltiga svampar,</u> <u>Nervgaser, Organiska</u> <u>fosforföreningar.</u>
		Biperiden	Akineton	Inj 5 mg/ml	2x5x1 ml	Mot extrapyramidala symtom vid överdosering med vissa neuroleptika. Se www.giftinfo.se : <u>Metoklopramid, Alimemazin.</u>
		Bromokriptin	Pravidel	Tabl 2,5 mg	1x100 st	Vid malignt neuroleptikasyndrom. Se www.giftinfo.se : <u>Malignt neuroleptikasyndrom.</u>
		Budesonid	Pulmicort Turbuhaler	Inhal-pulver 400 ug/dos	2x200 doser	Inhalationsbehandling vid exponering för retande gaser. Se www.giftinfo.se : <u>Retande gaser.</u>

GODKÄNT AV
Anna Graneväm

GRANSKAD AV
Birgitta Olander

GILTIGT FR O M
2024-10-10

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Budesonid	Pulmicort susp för nebulisator.	Suspension för nebulisator. Endosbehållare 0,5 mg/ml	1x20x2ml (I bas-sortiment på akm)	Inhalationsbehandling vid exponering för retande gaser. Se www.giftinfo.se Retande gaser.
		Cyproheptadin	Periactin (licens)	Tabl 4 mg	1x30 st	Vid serotonergt syndrom. Se www.giftinfo.se : Serotonergt syndrom.
		Deferoxamin	Desferal	Inj/inf subst 500 mg (1 ml = 100 mg deferoxaminmesilat sedan lösning beretts med 5 ml sterilt vatten)	1x10x500 mg	Vid överdosering med järn. Se www.giftinfo.se : Järn.
		Diazepam	Diazepam (licens)	Inj vätska/lösning 5 mg/ml	4x10x2 ml (I bas-sortiment på akm)	Vid kramper eller agitation i samband med akut förgiftning.
		Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA)	Succinaptal (licens)	Kapsl 200 mg	1x1x15 st	Vid förgiftning med arsenik, bly, guld, kvicksilver, oorganiska kvicksilverföreningar samt blyencefalopati. Se www.giftinfo.se : Arsenik , Bly , Kvicksilver .

GODKÄNT AV
Anna Graneväm

GRANSKAD AV
Birgitta Olander

GILTIGT FR O M
2024-10-10

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Dimerkaptopropansulfonat (DMPS)	Dimaval (licens)	Inj 50 mg/ml (1 ml = 50 mg natrium-2,3-dimerkaptopropan-1-sulfonat)	2x5x5 ml	Vid förgiftning med arsenik, bly, guld, kopparföreningar, kvicksilver samt oorganiska kvicksilverföreningar. Se www.giftinfo.se : <u>Arsenik</u> , <u>Bly</u> , <u>Kopparföreningar</u> , <u>Kvicksilver</u> .
		Flumazenil	Flumazenil	Inj 0,1 mg/ml	3x5x5 ml	Vid överdosering med bensodiazepiner och bensodiazepinderivat. Se www.giftinfo.se : <u>Bensodiazepiner</u> .
		Fomepizol (4-metylpyrazol)	Fomepizole	Inf konc 5 mg/ml	2x5x20 ml	Vid förgiftning med etylenglykol och metanol. Se www.giftinfo.se : <u>Etylenglykol</u> , <u>Metanol</u> .
		Fysostigmin	Anticholium (licens)	Inj 0,4 mg/ml (1 ml = 0,4 mg fysostigminalicylat)	2x5x5 ml	Vid antikolinerger förgiftning. Se www.giftinfo.se : <u>Antikolinergt syndrom</u> , <u>Dexklorfeniram</u> , <u>Klemastin</u> , <u>Prometazin</u> , <u>Baklofen</u>

GODKÄNT AV
Anna Graneväm

GRANSKAD AV
Birgitta Olander

GILTIGT FR O M
2024-10-10

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Fytomenadion (Vitamin K)	Konakion Novum	Inj 10 mg/ml	5x5x1 ml	Vid överdosering med kumarinpreparat. Se www.giftinfo.se : <u>Warfarin</u> , <u>Superwarfariner</u> .
	K	Glukagon	Glucagon	Pulver och vätska till inj vätska, förfylld spruta. 1 mg	3x1 mg	Blodsockerhöjande. Se www.giftinfo.se : <u>Batterier</u> , <u>Betablockerare</u> , <u>Bodypacker</u> , <u>Insulin</u> , <u>Kalciumantagonister</u> , <u>Sulfonureider</u> .
		Glukos	Glucos Fresenius Kabi	Inf 500 mg/ml (50%)	20x500 ml	Vid överdosering med kalciumantagonister och betablockerare. Se www.giftinfo.se : <u>Högdos insulin-euglykemiterapi vid akut förgiftning</u> , <u>Kalciumantagonister</u> , <u>Betablockerare</u> .
		Glukos-etanol	Glukos-etanol APL	Inf 50 mg/ml+100 mg/ml 1 ml = 50 mg glukos och 100 mg etanol.	6x1x500 ml	Vid förgiftning med etylenglykol och metanol. Se www.giftinfo.se : <u>Etylenglykol</u> , <u>Metanol</u> .

GODKÄNT AV
Anna Graneväm

GRANSKAD AV
Birgitta Olander

GILTIGT FR O M
2024-10-10

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Glycerylnitrat	Nitrolingual	Sublingualspray 0,4 mg/dos	1x200 doser (I bas-sortiment på akm)	Kärlvidgande och blodtryckssänkande. Se www.giftinfo.se : <u>Adrenalin</u> , <u>Ergotamin</u> , <u>Fenylpropanolamin</u> , <u>Klonidin</u> , <u>Metylfenidat</u> , <u>MAO-hämmare</u> , <u>Modafinil</u> , <u>Sumatriptan</u> , <u>Triptaner</u> .
		Glycerylnitrat	Nitroglycerin	Inf konc 5 mg/ml (Endast som tillsats till infusionsvätska)	10x1x5 ml	Kärlvidgande och blodtryckssänkande. Se www.giftinfo.se : <u>Adrenalin</u> , <u>Ergotamin</u> , <u>Fenylpropanolamin</u> , <u>Klonidin</u> , <u>Metylfenidat</u> , <u>MAO-hämmare</u> , <u>Modafinil</u> , <u>Sumatriptan</u> , <u>Triptaner</u> .
		Hydroxokobalamin	Cyanokit	Inf subst 5 g (5 g löses i bifogad 100 ml NaCl)	2x1x5 g AKM 1x5 g ambulans-helikopter 1x5 g HKP-ambulans-bil	Vid cyanidförgiftning. Se www.giftinfo.se : <u>Brandrök</u> , <u>Cyanid</u> .

GODKÄNT AV
Anna Graneväm

GRANSKAD AV
Birgitta Olander

GILTIGT FR O M
2024-10-10

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Hydroxokobalamin	Hydroxokobalamin	Inj. Vätska, lösning 1 mg/ml	1x5x1 ml	Lustgasutlöst funktionell B12-brist. Se www.giftinfo.se : <u>Lustgas</u>
	K	Idarucizumab	Praxbind	Inj/inf 50 mg/ml	1x2x50 ml (förvaras på IVA)	Vid överdosering/förgiftning med Pradaxa (dabigatran) Se www.giftinfo.se : <u>Dabigatran</u> .
		Immunserum mot botulism	Lagerhålls, i mån av tillgång, på Apoteket C W Scheele, Stockholm tel 010-447 61 00.	Kontakta Giftinformationscentralen för ev behandling med antitoxin.		Se www.giftinfo.se : <u>Botulism</u> .
	K	Immunserum mot ormgift (huggorm)	Vipera Tab (licens)	Inf konc 100 mg	2x2x4 ml	Vid bett av Vipera berus (huggorm). Se www.giftinfo.se : <u>Huggorm, Ormbett</u> .
	K	Insulin, Aspart	NovoRapid	Inj vätska, lösning 100 E/ml	5x10 ml (I bas-sortiment på IVA-KYL)	Se www.giftinfo.se : <u>Högdos insulin-euglykemitterapi - Giftinformationscentralen</u>

GODKÄNT AV
Anna Graneväm

GRANSKAD AV
Birgitta Olander

GILTIGT FR O M
2024-10-10

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Ipekakuana	Kräksirap APL	Oral lösning (1 ml = ca 2,5 mg ipekakuana- alkaloider beräknat som emetin). Inaktivt tillsammans med kol.	1x60 ml	Kräkmedel. Se www.giftinfo.se : <u>Kräkningsprovokation</u> eller i <u>förgiftningskapitlet i</u> <u>Läkemedelsboken</u> under kräkningsprovokation.
	K	Kalcitonin	Miacalcic	Inj/inf 100 IE/ml	2x5x1 ml	Vid hyperkalcemi.
	K	Kalciumfolinat	Calciumfolinat	Inj 10 mg/ml	8x1x10 ml	Vid metanolförgiftning och vid överdosering med folsyraantagonister. Se www.giftinfo.se : <u>Metanol</u> , <u>Metotrexat</u> .
		Kalciumglukonat	Calciumgluconat B Braun (licens)	Inj 94 mg/ml	1x20x10 ml	Vid förgiftning med fluor, fluorvätesyra, natriumfluorid, oxalsyra. Se www.giftinfo.se : <u>Fluorvätesyra</u> , <u>Natriumfluorid</u> , <u>Syror</u> .

GODKÄNT AV
Anna Graneväm

GRANSKAD AV
Birgitta Olander

GILTIGT FR O M
2024-10-10

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Kalciumglukonat	Calciumgluconate gel C-gel (från Medical Care System tillv.: Kays Medical Ltd)	Gel 2,5 %. Utvärtes.	1x40 g	Vid kutan exponering för fluorvätesyra. Se www.giftinfo.se : Fluorvätesyra.
		Kalciumglukonat, -laktat	Calcium-Sandoz	Brustabl 500 mg Ca 2+ Krossas för att påskynda upplösningen.	1 x 100 st	Vid förgiftning med fluor, fluorvätesyra, natriumfluorid, oxalsyra. Se www.giftinfo.se : Fluorvätesyra.
		Kol	Carbomix	Granulat till oral suspension Peroral tillförsel.	3x1x50 g	Se www.giftinfo.se : Initiala åtgärder – Medicinskt kol.
		Magnesiumsulfatheptahydrat	Magnesiumsulfat APL	Pulver till oral lösning	1x100g	Vid förgiftning med bariumföreningar. Se www.giftinfo.se : Barium
		Makrogol 400	Makrogol 400 APL	Kutan lösning Utvärtes. Ögonsköljvätska 33%	1x300 ml 1x1000 ml	Saneringsmedel vid kutan exponering för fenol. Se www.giftinfo.se : Fenol.
		Metyltionin	Methylthioninium chloride ProveBlue	Inj 5 mg/ml (1 ml=5 mg metyltioninklorid)	2x5x10 ml	Antidot vid methemoglobinemi. Se www.giftinfo.se : Glyceryltrinitrat , Brandrök , Fenol , Kopparföreningar , Methemoglobinemi , Nitrat , Prilokain .

GODKÄNT AV
Anna Graneväm

GRANSKAD AV
Birgitta Olander

GILTIGT FR O M
2024-10-10

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Naloxon	Naloxon	Inj 0,4 mg/ml	1x10x1 ml	Vid överdosering med analgetika av morfintyp. Se www.giftinfo.se : <u>Morfin</u> , <u>Metadon</u> , <u>Kodein</u> , <u>Fentanyl</u> , <u>Heroin</u> , <u>Buprenorfin</u> , <u>Dextropropoxifen</u> , <u>Tramadol</u> , <u>Loperamid</u> , <u>Klonidin</u> , <u>Valproat</u> .
		Natriumzirkoniumcyklosilika	Lokelma	Pulver till oral suspension 10g	1x30x10 g	Vid överdosering med kalium. Se www.giftinfo.se : <u>Kalium</u> .
		Natriumtiosulfat	Natriumtiosulfat APL	Inf 150 mg/ml	5x10x10 ml	Se www.giftinfo.se : <u>Brandrök</u> , <u>Cyanid</u> .
		Obidoxim	Toxogonin (licens)	Inj 0,25 g/ml	2x5x1 ml	Se www.giftinfo.se : <u>Ambenonklorid</u> , <u>Nervgaser</u> , <u>Organiska fosforföreningar</u> .
	K	Oktreotid	Oktreotid	Inj, lösning 50 mikrog/ml	1x5x1 ml (I bas-sortiment på IVA-KYL)	
		Olanzapin	Zyprexa	Inj subst 10 mg 1 ml = 5 mg	3x1x10 mg	Vid serotonerg toxicitet och agitation. www.giftinfo.se : <u>Serotonergt syndrom</u> .

GODKÄNT AV
Anna Graneväm

GRANSKAD AV
Birgitta Olander

GILTIGT FR O M
2024-10-10

Utg datum	Kyl- vara	Substans	Preparat	Beredn form/Styrka	Lager	Indikation
		Penicillamin	Metalcaptase Lagras enbart på Apoteket C W Scheele, Stockholm, tel 010-447 61 00	tabl 300 mg	Kontakta Gift- informations- centralen.	Vid förgiftning med koppar- föreningar. Se www.giftinfo.se : Kopparföreningar .
		Protamin	Protaminsulfat	Inj/inf 1400 antiheparin IE/ ml (1 ml=10 mg protamin- sulfat)	1x5x5 ml	Vid överdosering med heparin. Se www.giftinfo.se : Heparin , låg molekyllärt heparin .
		Pyridoxin	Pyridoxin APL	Inj 150 mg/ml (1 ml=150 mg pyridoxinhydroklorid)	5x10x2 ml	Vid förgiftning med isoniazid och stenmurkla. Se www.giftinfo.se : Isoniazid , Gyromitrinhaltiga svampar .
		Rivastigmin	Rivastigmin	Kapslar 3 mg	1x112 st	Vid långdragna antikolinera symtom. www.giftinfo.se : Antikolinergt syndrom

GODKÄNT AV
Anna Graneväm

GRANSKAD AV
Birgitta Olander

GILTIGT FR O M
2024-10-10