



## Läkemedel i förråd för SÄBO/Hemsjukvård.

Att ge vid akuta tillstånd efter ordination av läkare

Tillstånd	Läkemedel (ex)	Substans	Indikationer	Maxbeställning
Infektioner	Kåvepenin tabl. 1 g	fenoximetylpencillin (PcV)	Luftvägsinfektioner	20 st
	Doxyferm tabl. 100 mg	doxycyklin		10 st
	Furadantin tabl. 50 mg	nitrofurantoin	UVI	15 st
	Selexid tabl. 200 mg	pivmecillinam		15 st
	Ciprofloxacin tabl. 250 mg	ciprofloxacin		10 st
Smärta	Diklofenak supp. 50 mg	diklofenak	Stensmärta	10 st
	Morfin tabl. 10 mg	morfin	Annan svår smärta	25 st
	Morfin inj. 10 mg/ml	morfin	Akut svår smärta	20 x 1ml
Diabetes mellitus	NovoRapid Flex Pen inj. 100 IE/ml	insulin aspart	Hyperglycemi	1 förpackning à 5st
Astma	Combivent inhalation	ipratropium, salbutamol	Andningspåverkan	60 x 2,5 ml
	Atrovent inh.spray* 20 mikrog/dos	ipratropium		1 st
	Airomir inh.spray* 0,1 mg/dos	salbutamol		1 st
	Optichamber*	andningsbehållare		2 st
Hjärtsvikt	Furosemid tabl. 40 mg	furosemid	Ödem och/eller andningspåverkan	100 st
Bältros	Valaciclovir tabl. 500 mg	valaciclovir	Bältros	42 st
Palliativa läkemedel	Morfin inj. 10 mg/ml	morfin	För indikationer, se nästa sida	Ingen maxbeställning
	Oxycodone 10mg/ml	oxikodon		
	Midazolam inj 5 mg/ml	midazolam		
	Haldol inj. 5 mg/ml	haloperidol		
	Furix inj. 10mg/ml	furosemid		
	Glykopyrroniumbromid inj 200 mikrog/ml (= 0,2 mg/ml)	glykopyrronium		
	Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL 5 mg/ml	lidokain		

\* Att ge luftvägsvidgande läkemedel via andningsbehållare har visat sig vara lika effektivt som att ge det via nebulisator. Andningsbehållaren ska dock inte av hygieniska skäl återanvändas till flera patienter.

För ordinationer av preparat vid vård i livets slutskede, se nästa sida

## Vård i livets slutskede

Ordinationerna bör göras i förväg i samband med brytpunktssamtal, [Länk](#) till checklista för Brytpunktssamtal i primärvården

[Länk](#) till rutin för ordination och hantering av palliativa läkemedel

Symtom	Läkemedel (substans)	Förslag till dosering
Smärta	Morfin inj 10 mg/ml ( <i>morfin</i> )	0,25-0,75 ml sc vid behov, justera efter ålder om opioidnaiv. Annars 1/6 av parenteral dygnsdos (=1/2 av peroral dygnsdos). Upprepa efter 30 minuter om utebliven effekt.
	<b>Vid njursvikt:</b> Oxycodone inj 10mg/ml ( <i>oxikodon</i> )	0,25-0,75 ml sc vid behov, justera efter ålder om opioidnaiv. Annars 1/6 av parenteral dygnsdos (=1/2 av peroral dygnsdos). Upprepa efter 30 minuter om utebliven effekt. Ekvipotent med morfin
Andnöd	Morfin inj 10 mg/ml ( <i>morfin</i> )	0,25-0,5 ml sc vid behov, justera efter ålder. Upprepa efter 30 minuter om utebliven effekt.
	<b>Vid njursvikt:</b> Oxycodone inj 10mg/ml ( <i>oxikodon</i> )	0,25-0,5 ml sc vid behov, justera efter ålder. Upprepa efter 30 minuter om utebliven effekt. Ekvipotent med morfin
	Furix inj 10mg/ml ( <i>furosemid</i> )	2-4 ml iv eller sc, vid hjärtsviktsorsakad andnöd.
Ångest	Midazolam inj 5 mg/ml	0,5 ml sc
Förvirring	Haldol inj 5 mg/ml	0,5-1,0 ml sc, max 2 ggr/dygn
Illamående	Haldol inj 5 mg/ml	0,25 ml sc vid behov, max 2 ggr per dygn
Rosslighet	Glykopyrroniumbromid inj 200 mikrogr/ml (= Robinul 0,2 mg/ml)	0,5-1ml sc
Smärta i munnen	Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL 5 mg/ml	10-15 ml vb, Ingen dygnsmaxdos vid gurgling