

# TBC - BCG vaccination


En vaccination kan övervägas vid utlandsvistelse vid resor till länder med hög TB-förekomst om vistelsen blir långvarig (mer än tre månader).

BCG vaccination bör övervägas inför arbete eller studier i utsatta miljöer utomlands (t.ex. inom sjukvård, i flyktingläger, fängelser eller utländsk sjöfart).

BCG-vaccination kan också krävas av länder vid inresa och organisationer vid anställning.

\*Gränsvärdet kan variera mellan leverantörer av PPD

## 1. Flödesschema inför BCG vaccination



## 2. Hälsodeklaration avs. Tuberkulos

**Datum:**

Vårdinrättning:	Personnummer:
Sjuksköterska:	Namn:
Anledning till testet:	
Hemland:	Vistelse i land med hög TB-risk:
Ankomst till Sverige:	Tolk/språk:

	Ja	Nej	Kommentar
Tidigare tuberkulos? (ej aktuellt med PPD)	*		
Långvarig hosta med slemproduktion eller blod (>3v)?			
Onormalt mycket svettningar på natten?			
Feber under längre tid (>3v)?			
Gått ner i vikt? (vuxna: mer än 5 kg på 6 månader)			
Någon i närheten som haft Tuberkulos?			
BCG-vaccinerad ("tuberkulosvaccinerad")?	*		
Tidigare PPD? Resultat:			
Tidigare lungsjukdom? Sarkoidos?	*		
Tidigare lungröntgen?			
HIV infektion?			
Känd sjukdom som t.ex. IBD, hematologisk sjd, ...			
Hudpsoriasis som följs via Hudmottagningen?	*		
Mediciner: Kortison? Immundämpande medicin? Vilka + dos:	*		
Virusjukdom senaste tre månader (t.ex. mässling, körtelfeber)?	*		
Vaccinerats med levande vaccin senaste månaden?	*		
Gravid? Ammar?	*		Grav.vecka:

Lung-röntgen, datum	Resultat:
QuantiFERON, datum	Resultat:

**PPD 2TU:** 0,1 ml i.c. vänster underarm Batch:

Datum sättning: sign.	Datum avläsning: sign.	Resultat: mm
-----------------------	------------------------	--------------

<b>BCG-vaccination:</b> 0,1 ml i.c. vänster överarm	Ja	Nej	Batch:
Hinder enligt ovanstående frågor (*) eller enl. PPD-reaktion			Datum:
Aktuella infektionssymtom (feber?) eller uttalad hudinfektion?			sign. läk/sign. SSK
Skriftlig information om vaccinationsförloppet?			

### 3. Det normala vaccinationsförloppet vid BCG-vaccination

Upphöjningen efter vaccinationen försvinner efter en kort stund.

Efter ca 2-4 veckor

En rodnad och en liten förhårdnad uppkommer. Den ökar i storlek, blir röd och mer eller mindre upphöjd och täcks sedan med tunn blank hud.

Efter ca 4- 6 veckor

Vanligen (men inte alltid) brister blåsan och tömmer sig på var. Därefter vätskar såret mer eller mindre under några veckor.

Efter ca 8-12 veckor

En skorpa bildas, såret läker och efterlämnar ett litet platt ärr. I undantagsfall kan såret vätska i flera månader.

Normalt är också att man får en förstoring av lymfkörtlarna under armhålan.

**Att tänka på:**

- Som regel finns inga restriktioner beträffande idrott eller motion men utsätt inte såret för stötar eller slag.
- Undvik bad i badkar, bassäng och utomhus för att undvika infektioner under tiden som såret vätskar tills det är helt läkt. Alternativt sätt på vattentätt plåster under badet. Duscha går bra.
- När såret vätskar kan det skyddas med ett luftigt förband (torr steril kompress), inte plåster!
- Använd inte salvor, krämer eller sårpuder, det kan göra att det läker sämre.

Om vaccinationsreaktionen uteblir, alltså att inget händer på vaccinationsstället, eller om något onormalt uppstår kontakta vårdgivaren där Du fått din vaccination.

Hos nyfödda och barn, speciellt i låg ålder, blir reaktionen oftast liten och uppmärksammas inte om man inte direkt palperar området.

- Det tar cirka 6 veckor innan du kan räkna med full effekt av vaccinationen.
- BCG-vaccin ger skydd mot de svåraste formerna av Tuberkulos men i övrigt skydd i varierande grad mot Tuberkulos. Upprepad vaccination är inte aktuell.
- Inga andra vacciner bör ges i samma arm som BCG-vaccin förrän 3 månader efteråt. Om du ska vaccineras inom 1 månad efter BCG vaccination måste Du informera läkaren som ordinerar vaccinationen att du har fått BCG vaccination.

## 4. Intyg gällande BCG-vaccination

Personnummer: .....

Namn: .....

Datum: .....

Anledning till intyget: .....

PPD testad: .....

BCG-vaccinerad: .....

Quanti-FERON test: .....

Övrigt: .....

.....

Infektionskliniken  
Östersunds sjukhus