



Provtagning och provhantering, covid-19 inom Primärvård samt Kommunal vård och omsorg

Uppdaterad 231023 Länkar uppdaterade. Hänvisning till mikrobiologens provtagningsanvisning vid packning av prov. Dokumentation av prov.

Rutinen gäller för provtagning på patient med symtom, se länk gällande bedömning av symtom

Provtagning ska ske så snart det är praktiskt genomförbart efter symtomdebut.

Ingen bortre tidsgräns för provtagning finns, men i möjligaste mån rekommenderas provtagning inom 72 timmar från symptomdebut.

Provtagning

- Vid symtom ska provtagning i första hand ske med PCR. Har antigen test tagits och varit positivt behöver inte PCR tas.
- Individer som haft bekräftad covid-19 under de senaste 3 månaderna behöver inte provtas.
- **Vid negativt antigen svar, hos patient med symtom, ska PCR tas och patienten hanteras som smittsam tills negativt provsvar för PCR föreligger.**
- Informera patienten om att vid tilltagande symtom ska ny provtagning utföras om aktuellt testresultat blir negativt. Detta gäller oavsett om aktuell provtagning gjorts med antigen eller PCR.
- Viktigt att i provremissen ange om patienten bor på ett SÄBO, LSS eller H/T område och i så fall vilket det handlar om.
- Vid positivt antigen test på Hc skall SmiNet-anmälan göras skyndsamt. För boende på SÄBO ansvarar boendets läkare för provsvarshandling. Antigen svaret dokumenteras i lokala analyser.
- Läkaren ska dokumentera provtagningsindikation i journalen. Covidmall i Cosmic kan användas.

Provtagningsanvisningar

- Provtagningsanvisning SARS-COV-2, PCR

Innan antigen test används ska provtagaren ta del av följande information:

- Skriftlig information om Antigen test Region
- Antigen test inom kommunal vård-och omsorg